

— 8 —

Dai 50 anni ai 60:

Brettner 3 casi (21-23) — Piazza-Martini 2 casi (123) — Storch (148) = Totale casi 5.

Dai 60 anni ai 70:

Borgherini (18) — Conti (55) — Giannotti (87) — Piazza-Martini 3 casi (123) — Valsalva (Davalos op. cit.) (157) = Totale casi 7.

Dai 70 anni agli 80:

Luzzatti (90) = Totale casi 1.

Questa statistica assegna quindi la massima frequenza dell'Echinococco in un periodo dell'età compreso fra i 20 e i 30 anni, limite che potrebbe essere portato sino ai 40 anni poichè fra i due periodi vi ha una differenza insignificante. Questo fatto concorda perfettamente colle statistiche riferite da R. Blanchard (op. cit. p. 453), le quali credo utilissimo qui trascrivere:

	Wolf	Krummrich	Bicker	Finsen	Neisser	Helm
0 a 10 anni	»	4	»	20	29	»
11 a 20 anni	6	15	4	49	65	10
21 a 30 anni	12	14	8	65	134	19
31 a 40 anni	9	15	8	38	123	17
41 a 50 anni	1	8	6	22	26	7
51 a 60 anni	»	4	3	23	31	13
61 a 70 anni	»	4	4	11	14	1
71 a 80 anni	»	1	»	5	7	1
al di là di 80 anni	»	»	»	2	»	»
TOTALE	28	65	33	245	500	59

III. Distribuzione dell'Echinococco nei diversi organi del corpo umano.

Casi N. 183.

Fegato.

Alessio (2) — Bianchi (Davalos op. cit.) (12) — Borgherini casi 3 (16) — Brancato (29) — Brettner casi 3 (23) — Bruni (35) — Bueresi (27) — Cognetta casi 2 (28) — Cantani casi 3 (31-32-33) — Cardarelli (36) — Caselli casi 2 (39) — Casini (Davalos op. cit. (43) — Cavazzani (42) — Chisje (Della) casi 4 (44) — Cimbali casi 2 (47) — Concato casi 2 (50) — Conzatti casi 2 (53) — Conti casi 3 (55) — D'Antona casi 9 (61-62-63) — Duranta (67) — Franco (78) — Gallico (81) — Gulliozzi (82) — Ghillini (85) — Giannotti (87) — Guattani (Davalos op. cit.) (90) — Loreta (95) — Mariotti (100) — Migoli (104) — Morgagni (106) — Orsi (107) — Paazarelli (Davalos op. cit.) (110) — Pasella (112) — Peroncello (120) — Piazza-Martini casi 18 (123) — Postempoki casi 4 (125-126) — Pozzi (127) — Rosoni (134) — Rosoni e Mariotti casi 2 (135) — Ruggi (139) — Sennola (145) — Spantigati (147) —