

PRINCIPALI BACINI DI LIGNITE.

Nome della miniera o località	Ubicazione	Formazione geologica Numero e potenza dei banchi di carbone	Potere calorifico (calorie)	Produzione annua attuale tonnellate	Quantità totale di car- bone che si ritiene ancora esistere nel 1880 (tonnellate)
1.° Monte Pulli . .	In Valle dell' Agno, Comune di Valda- gno (Vicenza).	<i>Eocene o terziario inferiore.</i> — Nove banchi di lignite della com- plessiva potenza di 9 ^m e tre ban- chi di scisto bituminoso fra strati calcarei e marnosi. — Disposi- zione a conca e con direzione generale E. O.	3.800 a 4.700	22.000	400.000
2.° Bacino di Gon- nesa in Sardegna. — Concessioni diverse dette di Fontanmare Ba- cu-Abis e Terras de Collu.	Comune di Gonnese, (Iglesias, Cagliari).	<i>Eocene.</i> — 3 a 4 banchi di 0 ^m .60 ad 1 ^m .50 della complessiva poten- za di 2 a 3 ^m , intercalati ad are- narie e calcari fossiliferi, quasi orizzontali.	5.200 a 5.600	14.000	5.500.000
3.° Cadibona. . . .	Comune di Savona (Genova).	<i>Miocene lacustre.</i> — Un banco prin- cipale di 2 ^m .50 fra arenarie ar- gillose pendenti di 25° all' Est.	4.800	4.000 (nel 1878)	quasi esaurito
4.° Garbeme pres- so Nuceto.	Alta Valle del Tana- ro, Comuni di Nu- ceto, Bagnasco e Massimino (Mondo- vi, Cuneo).	<i>Miocene lacustre.</i> — Un banco di 1 ^m a 0 ^m .60 entro marne alternanti con puddinghe e calcari.	4.360 a 4.880	2.000	—
5.° Sarzana, divisa in due miniere contigue dette Sarzanello e Ca-	Sarzanello è in Co- mune di Sarzana, (Spezia, Genova). — Caniparolo è in Co-	<i>Miocene (superiore).</i> — Un banco di 2 ^m a 2 ^m .50 con pendenza va- ria al S. O.	5.040 a 5.860	15.000	600.000